Campanadas diastólicas

Mario Vargas Galgani

Correspondencia

Mario Vargas Galgani
mariovar@hotmail.com

Laboratorio de Ecocardiografía, Clínica San Felipe Lima. Perú.

Citar como: Vargas Galgani M. Campanadas diastólicas. Rev Ecocardiogr Pract Otras Tec Imag Card (RETIC). 2025 Ago; 8(2): I-V. doi: <https://doi.org/10.37615/retic.v8n2a1>.

Cite this as: Vargas Galgani M. *Diastolic bell soundst*. Rev Ecocardiogr Pract Otras Tec Imag Card (RETIC). 2025 Aug; 8(2): I-V. doi: <https://doi.org/10.37615/retic.v8n2a1>.

«No podemos resolver problemas pensando de la misma manera en que los creamos».

ALBERT EINSTEIN

El ecocardiograma *doppler* desde sus inicios permitió evaluar el llenado del ventrículo izquierdo, de la aurícula izquierda (flujo venoso pulmonar) y evaluar la presión de la arteria pulmonar.

Estos datos desarrollaron diferentes conceptos, establecieron la presencia de patrones normales y anormales y de la disfunción diastólica y la insuficiencia cardíaca diastólica o insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada (ICCFEP)¹.

Los valores y patrones de anomalía tenían relación con la sintomatología, la hemodinámica y el pronóstico del paciente, con independencia de la causa de la anomalía.

Incluso el patrón de llenado tipo I ($E < A$) o llenado de relajación anormal (en una publicación muy reciente) se asocia a un pronóstico diferente en los pacientes, a pesar de ser considerada una anomalía muchas veces menor, pues no implica elevación de presiones de llenado².

Se establecieron guías de clasificación considerando el llenado del ventrículo izquierdo (VI), el flujo venoso pulmonar, el tamaño de la aurícula izquierda (AI) y la velocidad de la regurgitación tricúspide.

A pesar de ser aceptadas universalmente, utilizando diferentes nomogramas, un grupo variable de pacientes, que puede estar entre el 10 y el 40%, quedan en una zona gris no clasificada³.

Es uno de los motivos por los que en los últimos años aparecen diferentes índices que evalúan la función diastólica y que van demostrando en los estudios importancia pronóstica y utilidad clínica.

El **índice de rigidez (IR) de la AI** se calcula dividiendo la relación E/E' entre el *strain* de reservorio ($E/E'/Sr$). Trata de relacionar un índice indirecto de presiones de llenado con un índice de función atrial. Posiblemente el nombre no es el mejor pues la rigidez se mide en las curvas de presión/volumen calculando el cambio de presión con respecto al cambio de volumen. Como el E/E' normal es menor a 10 y el *strain* de reservorio > 30%, el valor de corte normal se encuentra entre 0,25 y 0,3.

Desde 2009 están apareciendo publicaciones de la utilidad de este índice. Kurt y col. muestran que el IR se ha mostrado muy preciso para diferenciar ICCFEP de la disfunción diastólica y correlaciona muy bien con la presión sistólica de la arteria pulmonar⁴.

Shaikh y col. encuentran que el IR es totalmente diferente en pacientes con fibrilación atrial vs normales (0,23 vs 1,32) incluso después de realizar una cardioversión (1,05)⁵. Lami y col. encuentran relación entre el IR y el grado de fibrosis atrial usando cardioresonancia⁶. Kim y col. en un estudio reciente demuestran que el IR usando un valor de corte de 0,26 tuvo valor pronóstico en la supervivencia libre de eventos en pacientes con ICCFEP⁷.

Si bien un nombre inadecuado en varios de los estudios nombrados fue superior en pronóstico e independiente de los índices usuales de función diastólica.

El **índice de acoplamiento atrioventricular izquierdo** (IAAVI) consiste en comparar el volumen mínimo de la AI dividido entre el volumen telediastólico del VI.

Es en la telediástole donde ambas cámaras están perfectamente acopladas, su medición conjunta podría ser superior a las mediciones aisladas de sus dimensiones y volúmenes. El crecimiento de la AI desproporcionado al VI (común en la falla diastólica y en la miopatía atrial) incrementaría el índice y podría asociarse a eventos clínicos. El valor normal usualmente está por debajo de 0,3.

De las muchas publicaciones al respecto rescato el de la población MESA (hecho con cardioresonancia) publicado en 2021 en que el IAAVI se asocia de manera independiente con el desarrollo de fibrilación atrial y el de insuficiencia cardíaca así como la mortalidad por ICC o por enfermedad coronaria. Usaron un valor de corte de 0,25 o 25%⁸.

Otro estudio más reciente investiga de manera retrospectiva el valor pronóstico del IAAVI en 1.158 pacientes con ICC estables en tratamiento médico óptimo. El índice fue cada vez mayor de acuerdo con el grado de disfunción diastólica ($p < 0,01$), incrementó el valor pronóstico sobre otras variables clínicas y ecocardiográficas de manera independiente⁹.

También ha demostrado su utilidad pronóstica en pacientes con infarto de miocardio y en el desarrollo de fibrilación atrial en pacientes con cardiomiopatía hipertrófica^{10,11}.

Es un índice que usa solo eco bidimensional, muy aplicable, debe testarse su reproducibilidad. No se ha usado específicamente en pacientes en zona gris de función diastólica, podría ser muy útil en fibrilación atrial y en detectar la miopatía atrial.

Un tercer índice nace con la necesidad de comparar las presiones de llenado con la compliance del VI.

El volumen máximo indexado de la AI (VAIi) se incrementa con la reducción de la compliance del VI¹². La onda A tisular del anillo mitral (A') se reduce cuando se incrementa las presiones de llenado del VI¹³. Por tanto la relación VAIi/A' podría reflejar anomalías diastólicas. Se ha llamado a este **índice de acoplamiento volumétrico/mecánico de la AI** (LACI).

Usando este índice Park y col.¹⁴ muestran su uso (un valor mayor a 4) para predecir mortalidad y supervivencia libre de eventos en pacientes hospitalizados por disnea (395 pacientes) independiente en el estudio multivariable, siendo el valor mayor conforme empeora la disfunción diastólica.

El índice ha demostrado ser pronóstico en pacientes con enfermedad coronaria aguda y capaz de identificar pacientes con hipertensión arterial que desarrollan fibrilación atrial¹⁵. Benfari y col. encuentran el índice asociado de manera independiente a exceso de mortalidad en pacientes con insuficiencia cardíaca y FE reducida¹⁵. Finalmente Mannina estudia a pacientes mayores de 55 años sin ICC durante más de 11 años, el 43% desarrolló ICC en los años de seguimiento, todas las medidas de tamaño y función de la AI se asociaron a desarrollo de ICC, en el análisis multivariable, el índice de rigidez y LACI permanecieron asociados a incidencia de ICC, un ajuste final con el *strain* del VI dejó solo al LACI asociado al desarrollo de ICC¹⁶.

Tres nuevos índices que buscan su propio lugar en el armenario diagnóstico de la disfunción diastólica y la insuficiencia cardíaca.

Nuevos estudios, especialmente prospectivos, con pacientes en zona gris y con estudios de reproducibilidad van a demostrar el potencial real de estos índices.

Es por esto que la diástole sonrío de felicidad.

Referencias

1. Ponikowski P, Voors AA, Anker SD, Bueno H, Cleland JGF, Coats AJS, ESC Scientific Document Group *et al*. 2016 ESC Guidelines for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure: the Task Force for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure of the European Society of Cardiology (ESC) Developed with the special contribution of the Heart Failure Association (HFA) of the ESC. *Eur Heart J* 2016;37:2129–200. doi: <https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehw128>
2. Young, K., Rodeheffer, R., Bird, J., Miranda, M., Chen, H, Oh, J, Kane, E., Association of Impaired Relaxation Mitral Inflow Pattern (Grade 1 Diastolic Function) With Long-Term Noncardiovascular and Cardiovascular Mortality, *J Am Soc Echocardiogr* 2025;38:367-77. doi: <https://doi.org/10.1016/j.echo.2025.01.005>
3. Borlaug BA. The pathophysiology of heart failure with preserved ejection fraction. *Nat Rev Cardiol* 2014 (509):507-515 doi: <https://doi.org/10.1038/nrcardio.2014.83>
4. Kurt M, Wang J, Torre-Amione G, Nagueh SF. Left atrial function in diastolic heart failure. *Circ Cardiovasc Imaging*. 2009;291:10–15. doi: <https://doi.org/10.1161/CIRCIMAGING.108.813071>
5. Shaikh A, Mann A, Khan U., Aurigemma G *et al*. Speckle echocardiographic left atrial strain and stiffness index as predictors of maintenance of sinus rhythm after cardioversion for atrial fibrillation: a prospective study. *Cardiovascular ultrasound* 2012 10:48 doi: <https://doi.org/10.1186/1476-7120-10-48>
6. Lamy J, Taotuel R., Chamoun R., Akar J., *et al*. Atrial fibrosis by Cardiac MRI is a correlate for atrial stiffness in patients with atrial fibrillation. *Research Square Preprint* 18/04/2023
7. Kim D., Hun Seo J., Hong Choi K., HuinLee S., *et al*, Prognostic implications of left atrial stiffness index in Heart Failure patients with preserved Ejection fraction, *J Am Coll Cardiol Img* 2023;16:435–445 doi: <https://doi.org/10.1016/j.jcmg.2022.11.002>
8. Pezel T, Venkatesh BA, De Vasconcellos HD, *et al*. Left trioventricular coupling index as a prognostic marker of cardiovascular events: the MESA study. *Hypertension* 2021;78:661-71 doi: <https://doi.org/10.1161/HYPERTENSIONAHA.121.17339>
9. Fortuni, F., Biagioli, P., Myagmardorj, R., Mengoni, A., Chua, AP, Zuchi, C., Sforza, S, Bax, J., Marsan, NA., Ambrosio, G., Left Atrioventricular Coupling Index: A Novel Diastolic Parameter to Refine Prognosis in Heart Failure. *J Am Soc Echocardiogr* 2024;37:1038-46. doi: <https://doi.org/10.1016/j.echo.2024.06.013>
10. Lange T, Backhaus SJ, Schulz A, *et al*. Cardiovascular magnetic resonance derived left atrioventricular coupling index and major adverse cardiac events in patients following acute myocardial infarction. *J Cardiovasc Magn Reson* 2023;25:24. doi: <https://doi.org/10.1016/j.jcmr.2024.06.013>
11. Meucci MC, Fortuni F, Gallo X, *et al*. Left atrioventricular coupling index in hypertrophic cardiomyopathy and risk of new-onset atrial fibrillation. *Int J Cardiol* 2022;363:87-93. doi: <https://doi.org/10.1016/j.ijcard.2022.06.017>
12. Tsang TS, Barnes ME, Gersh BJ, *et al*. Left atrial volume as a morphologic expression of left ventricular diastolic dysfunction and relation to cardiovascular risk burden. *Am J Cardiol*. 2002;90:1284–1289. doi: [https://doi.org/10.1016/s0002-9149\(02\)02864-3](https://doi.org/10.1016/s0002-9149(02)02864-3)
13. Khankirawatana B, Khankirawatana S, Peterson B, *et al*. Peak atrial systolic mitral annular velocity by Doppler tissue reliably predicts left atrial systolic function. *J Am Soc Echocardiogr*. 2004;17:353–360. doi: <https://doi.org/10.1016/j.echo.2003.12.023>
14. Park HJ, Jung HO, Min J, Park MW, Park CS, Shin DI, Shin WS, Kim PJ, Youn HJ, Seung KB. Left atrial volume index over late diastolic mitral annulus velocity (LA-Vi/A) is a useful echo index to identify advanced diastolic dysfunction and predict clinical outcomes. *Clin Cardiol*. 2011;34:124–130. doi: <https://doi.org/10.1002/clc.20850>
15. Benfari G, Essayagh B, Nistri S, *et al*. Left atrial volumetric/mechanical coupling index: a novel predictor of outcome in heart failure with reduced ejection fraction. *Circ Cardiovasc Imaging* 2021;14:e011608. *Circ Cardiovasc Imaging* 2021;14:e011608.
16. Mannina, C., Ito K., Jin, Z., Yoshida, Y., Russo, C., Nakanishi, K., Tatjana Rundek, T., Homma, S., Elkind, M., Di Tullio, M., Left Atrial Function and Incident Heart Failure in Older Adults. *J Am Soc Echocardiogr* 2025;38:103-10. doi: <https://doi.org/10.1161/CIRCIMAGING.120.011608>